

ORIANE cov

EPOQUE DE MATURITE :

5 à 7 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov, du 03/08/2008 au 13/08/2008, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : INRA Bordeaux, Gironde, France

EDITEUR : CEP INNOVATION,


COV : En demande

Clone INFEL® : 6422

Certification : Oui

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, demi-étalé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme très aplatie, assez régulier. Le sommet du fruit est généralement assez bien fermé, mais le point pistillaire présente des taches liégeuses sur quelques fruits.

La coloration de l'épiderme rouge à rouge orangé, lumineuse, est moyenne à importante (60 à 85 % de la surface), sur un fond jaune orangé.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne.

La fermeté est bonne.

La texture est fine et juteuse.

Le fruit est de bonne qualité gustative, de saveur douce.

Le poids moyen varie entre 100 et 130 grammes, parfois plus.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			12 15
Acidité (meq/100ml)	3 5		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle apprécie :

- une aide pour installer ses coursonnes
- une bonne aération de ses arbres, afin de limiter la sensibilité aux maladies de conservation

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre
- une récolte anticipée qui nuit à la coloration des fruits

ORIANE® est une variété de mise à fruit rapide et les arômes musqués de ses fruits sont très agréables.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur, une distance de 3.5 m sur le rang est préconisée pour une conduite en gobelet classique ou double Y.

Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela, il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 1ère et 2ème année et, par la suite, les arbres seront, soit ouverts par la taille, soit par attachage.

Ces écimages sont également indispensables pour favoriser la sortie de sous-mères.

L'installation de coursonnes est facile.

Taille de fructification

Il s'agit d'une taille stricte, sur rameaux mixtes de bonne qualité.

Le reperçement sur bois de 2 ans est très important : il combine à la fois des productions courtes et très courtes et des rameaux mixtes de qualité.

La taille en vert est importante pour favoriser la coloration des fruits et l'aération des arbres, ce qui permet de réduire la sensibilité des fruits aux maladies de conservation.

Les rameaux mixtes en position subverticale confèrent aux fruits qu'ils portent une plus grande sensibilité aux monilioses. Il est donc important de pratiquer une taille après récolte qui éliminera ce type de bois et les éventuelles momies.

Eclaircissage

Il est généralement de forte intensité et à réaliser après la chute physiologique qui se produit généralement toutes les années. Il sera qualitatif, dans le sens où il permettra d'éliminer les fruits dont la cuvette oculaire n'est pas totalement fermée.

Une retaille permet d'éliminer les fruits en excès sur les rameaux pendants ou grêles.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 25 tonnes produites par ha pour un poids moyen de fruit de 100 à 130 g, soit 200 000 à 220 000 fruits par hectare.



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Sensibilités particulières

ORIANE cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées au déficit en froid hivernal. Le fruit est sensible aux maladies de conservation. Il faudra veiller à éviter tout à-coup de végétation qui favorise l'éclatement des fruits au niveau de la cuvette oculaire. L'épiderme du fruit a tendance à s'arracher au point d'attache en cas de cueillette de fruits mûrs.

Appréciation

ORIANE cov se caractérise par sa mise à fruit rapide et sa rusticité. La qualité gustative des fruits est très bonne et supporte, de ce fait, une cueillette anticipée (arrachement pédonculaire).

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/08/2008	13/08/2008	5 à 7 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/07/2007	30/07/2007	5 à 7 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2006	08/08/2006	5 à 7 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov

