

TIFFANY® Monyfa cov

EPOQUE DE MATURITE :

5 à 7 jours avant ONYX® Monalu cov , du 20/06/2012 au 30/06/2012, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov , du 27/06/2012 au 07/07/2012, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

OBTENITEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : 012040


Certification : Non

N° Etude : 82.6

N° Editeur : SF 97-093

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Acrotone, demi-érigé
- Qualité du bois : Moyenne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque précoce
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ronde, régulier, légèrement aplati.

La coloration rouge foncé à rouge rosé de l'épiderme est importante (95 à 80 % de la surface) et attrayante. La couleur de fond est vert crème à crème.

L'épiderme est épais.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne. Le fruit tient très bien sur l'arbre, mais se ramollit brusquement à l'approche de la maturité.

Le fruit est de qualité gustative moyenne à bonne et de saveur douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 12	
Acidité (meq/100ml)	3 5		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les coupes dans le haut des arbres qui la déséquilibrent
- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre
- une vigueur excessive qui favorise la sortie de rameaux longs et fins généralement peu floribonds

Elle apprécie :

- que ses branches soient ouvertes, même artificiellement
- produire sur rameaux mixtes insérés sur coursonnes
- une taille tardive après une prétaille de fin d'été

TIFFANY® est une variété pour laquelle il faudra veiller à maintenir la qualité du bois.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la forte vigueur, un écartement de 3.5 m sur le rang est nécessaire pour une conduite en gobelet ou double Y.

Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela, il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 1ère et 2ème année. Par la suite, les arbres seront, soit ouverts par la taille, soit par attachages (mode taillé-tiré). Dans le premier cas de figure, il faut veiller à ne pas installer de déséquilibre du fait du port acrotone de la variété.

Les écimages permettent le plus souvent de multiplier le nombre de branches, mais pas nécessairement d'installer des sous-mères. Il en est de même pour les coursonnes et il est nécessaire de les établir, puis de les renouveler par attachages de bois de deux ans.

Taille de fructification

Il s'agit d'une taille classique, sur rameaux mixtes.

La qualité de rameaux est généralement moyenne, ils sont longs et fins. Le repercement est de qualité moyenne et les rameaux ont tendance à s'éloigner sur le bois de deux ans. Comme la retaille après récolte n'est possible que dans les situations précoces, il conviendra de lutter contre l'éloignement de la production par arcures de rameaux vigoureux qui deviendront des coursonnes.

La taille en vert est importante, à la fois pour limiter le dégarnissement et pour éliminer tout déport de végétation vers le haut des arbres. Cette propension est assez marquée.

Eclaircissage

Il est généralement de forte intensité et doit être effectué précocement. Un figelage effectué au stade "fruits gros comme une noix" permet d'éliminer les fruits excédentaires ou mal placés.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 20 tonnes par ha produites pour un poids moyen de fruit de 135-140 g (B 50 %, A 40 %, C 10 %). Le nombre de fruits sera donc voisin de 150 000 à 160 000 par hectare.



Sensibilités particulières

TIFFANY® est peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.
La fermeté du fruit évolue rapidement à maturité.
Le potentiel aromatique diminue en fin de récolte.
L'arbre a tendance à se dégarnir rapidement.
La sensibilité aux noyaux fendus est faible.

Appréciation

TIFFANY® est une variété très fertile pour laquelle un éclaircissage précoce et rigoureux est indispensable.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/06/2012	07/07/2012	1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/06/2011	22/06/2011	1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/07/2010	13/07/2010	Epoque ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/06/2012	30/06/2012	5 à 7 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/06/2011	21/06/2011	4 à 6 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/06/2010	12/07/2010	1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/06/2009	03/07/2009	Epoque ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/06/2008	03/07/2008	2 à 4 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/06/2006	04/07/2006	1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/07/2010	18/07/2010	1 à 3 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/06/2009	10/07/2009	Epoque ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/06/2008	06/07/2008	3 à 5 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/06/2007	03/07/2007	3 à 5 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/06/2006	07/07/2006	3 à 5 jours avant ONYX® Monalu cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

