

# NECTAPOM® Nectagala COV

## EPOQUE DE MATURITE :

22 à 24 jours après NECTAROSS cov, du 19/08/2017 au 30/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

21 à 23 jours après NECTAROSS cov, du 19/08/2017 au 31/08/2017, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

20 à 22 jours après NECTAROSS cov, du 20/08/2017 au 01/09/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENITEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV Communautaire : EU 21908 N° Etude : ASF 01.05

## L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Le fruit est de forme ovale, assez régulier.

La coloration rouge grenat à rouge orangé (80 à 60 %) est

lumineuse. La couleur de fond est jaune à jaune orangé.

L'épiderme est épais et parfois pigmenté en fonction de la charge des arbres.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La résistance aux manipulations est très bonne et autorise des récoltes espacées.

La qualité gustative est bonne à très bonne.

La texture est croquante et la saveur semi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			10 13
Acidité (meq/100ml)	5 8		
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les excès de vigueur au cours des premières années qui retardent la mise à fruit
- d'être en sous-charge
- une conduite en branches directes

Elle apprécie :

- les attachages de coursonnes et bois de 2 ans
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- une attention particulière afin de limiter le potentiel de calibre
- un ceinturage des arbres ou la pose de perchettes
- une taille tardive après une pré-taille de fin d'été

## La conduite

### Distances de plantation

Compte tenu de la taille allongée, un écartement de 3.5 m sur le rang est préférable pour une conduite en gobelet ou double Y et assurer un vieillissement satisfaisant. Un porte-greffe vigoureux n'est pas indispensable pour maintenir la vigueur de l'arbre.

### Taille de formation

Elle est de type classique pour les variétés à port érigé. Les écimages sont indispensables pour une conduite en gobelet. Par la suite, le mode «taillé - tiré» convient parfaitement et évite de pratiquer des coupes d'ouverture trop fortes.

Les sous-mères s'installent facilement, les coursonnes sont formées à partir de rameaux vigoureux et/ou bois de 2 ans.

La mise à fruit étant plutôt lente sur cette variété, il faudra éviter les grosses coupes qui la retardent.

La charge des arbres et le poids moyen élevé des fruits ont tendance à affaïsser les charpentières : par mesure de précaution, il est possible de «ceinturer» l'arbre s'il est conduit en gobelet ou double Y, mais il faut le faire avant la déformation des charpentières. En fait, il est préférable d'attacher des charpentières opposées, 2 par 2, ce qui leur évite de glisser latéralement, comme cela se produit souvent avec un simple ceinturage. A défaut, il faudra prévoir de soutenir les charpentières par des perchettes.

### Taille de fructification

Il faudra pratiquer une taille allongée. Les bois de 2 ans ont tendance à repercer en émettant de petites productions et de beaux rameaux mixtes. La taille consistera à garder en alternance des rameaux mixtes qui ont une floribondité moyenne et les petites productions très fertiles. Le rameau mixte situé en extrémité du bois de 2 ans est toujours de très bonne qualité : dans la mesure du possible, il faudra le conserver.

Il est préférable de supprimer les rameaux forts et érigés ; lorsqu'ils sont conservés, ils se transforment généralement en bois de 2 ans très (trop) vigoureux qui déstabilisent l'arbre.

### Eclaircissage

Il est de faible à très faible intensité, surtout les premières années : il consiste le plus souvent à un simple dégrappage. Il sera réalisé tardivement en une seule opération.

### Taille en vert

La taille en vert est nécessaire et indispensable ; elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration des fruits

### Alimentation hydrominérale

La fertilisation azotée devra être particulièrement soutenue pendant la période de croissance des pousses feuillées (mai - juin), afin d'éviter le blocage des arbres.



## Récolte

La maturité est groupée : 2 à 3 passages très échelonnés.

## Potentiel de production

Il est proche des 40 à 50 tonnes, voire plus, avec un poids moyen de l'ordre de 190 - 200 g (AA 50 à 60 %, A 40 à 50 %, AAA 10 à 20 %). Le pourcentage de calibre A et + doit être de l'ordre de 80 à 90 %. Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 250 à 260 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

## Sensibilités particulières

NECTAPOM® Nectagala n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsque celles-ci sont liées aux automnes doux et à un déficit de froid en hiver.

Le fruit est peu sensible aux maladies de conservation et à la fente du noyau. En cas de sous-charge, il peut être très ponctué.

## Appréciation

NECTAPOM® Nectagala cov est une variété à très fort potentiel agronomique lorsque les arbres sont équilibrés. La fermeté exceptionnelle du fruit autorise des cueillettes espacées qui permettent de réduire le nombre de passages. La coloration des fruits est supérieure aux variétés de type NECTAPOM de même époque de maturité. Il faudra néanmoins s'attacher à maintenir la vigueur des arbres et à limiter le potentiel de calibre des fruits. Cette variété est mieux adaptée aux zones méridionales de production.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/08/2017	31/08/2017	21 à 23 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/08/2016	22/08/2016	10 à 12 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	16/08/2015	26/08/2015	9 à 11 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/08/2014	13/08/2014	15 à 17 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/08/2013	30/08/2013	15 à 17 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN  
30127 Bellegarde  
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/08/2012	25/08/2012	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2011	19/08/2011	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2010	02/09/2010	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2009	16/08/2009	10 à 12 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2008	16/08/2008	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/08/2007	20/08/2007	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2017	30/08/2017	22 à 24 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/08/2016	31/08/2016	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2015	01/09/2015	16 à 18 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/08/2014	17/08/2014	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/08/2013	08/09/2013	19 à 21 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2012	31/08/2012	15 à 17 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/08/2011	21/08/2011	5 à 7 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2010	05/09/2010	9 à 11 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/08/2009	24/08/2009	13 à 15 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/08/2008	24/08/2008	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/08/2007	21/08/2007	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2017	01/09/2017	20 à 22 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/08/2016	07/09/2016	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2015	02/09/2015	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/08/2014	26/08/2014	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/09/2013	17/09/2013	14 à 16 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN  
30127 Bellegarde  
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

