

NECTAPOM® Nectapink COV

EPOQUE DE MATURITE :

1 à 3 jours après NECTAROSS cov, du 29/07/2017 au 14/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

Epoque NECTAROSS cov, du 01/08/2017 au 13/08/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV Communautaire : EU 21909 N° Etude : ASF 01.04

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, érigé à demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Très forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde, régulier.

L'épiderme de coloration rouge grenat à rouge foncé (90 à 60 %) est parfois terne sur le premier passage puis il devient lumineux par la suite. La coloration devient plus orangé à l'intérieur de l'arbre.

La couleur de fond est jaune orangé.

L'épiderme est épais et légèrement ponctué.

Le noyau est gros, semi-adhérent.

La qualité gustative est bonne et la saveur semi-douce.

La texture est croquante.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			10 13
Acidité (meq/100ml)		5 8	
Arômes			

(*) IR pimprenelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- d'être en sous charge
- une conduite en branches directes

Elle apprécie :

- les attachages de coursonnes et bois de 2 ans
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- une attention particulière afin de limiter le potentiel de calibre
- un ceinturage des arbres ou la pose de perchettes
- une taille tardive après une pré-taille de fin d'été

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la taille allongée un écartement de 3.5 m sur le rang est préférable pour une conduite en gobelet ou double Y et assurer un vieillissement satisfaisant. Un porte-greffe vigoureux est parfois indispensable pour maintenir la vigueur de l'arbre.

Taille de formation

Il n'y a pas de difficultés dans la formation de l'arbre, les charpentières s'ouvrent naturellement sous le poids des fruits. Compte tenu du très grand potentiel agronomique de la variété, il faut donc veiller à ne pas trop ouvrir les arbres pour une formation en gobelet ou double Y.

Des écimages d'été en 1ère feuille sont néanmoins nécessaires, ils aideront à rigidifier et structurer les charpentières.

En fonction de l'ouverture naturelle des charpentières (favorisée par une mise à fruit très rapide, le poids des fruits,...) et des reperçements, en 2ème feuille des écimages sont possibles. Si les charpentières sont déjà assez ouvertes, il peut s'avérer utile de les réorienter en coupant sur un rameau ce qui permet de les renvoyer vers l'intérieur de l'arbre.

Le mode de formation taillé-tiré convient très bien car il permet de choisir l'inclinaison des charpentières et, par exemple, de les laisser se développer avant de les tirer.

Par mesure de précaution il est possible de «ceinturer» l'arbre s'il est conduit en gobelet ou double Y mais il faut le faire avant la déformation des charpentières. En fait il est préférable d'attacher des charpentières opposées 2 par 2 ce qui leur évite de glisser latéralement comme cela se produit souvent dans un simple ceinturage. A défaut il faudra prévoir de soutenir les charpentières par des perchettes.

Taille de fructification

Une taille semi-allongée réalisée tardivement sera possible.

Les plus beaux rameaux mixtes sont conservés, même si généralement ils sont en position éloignée sur le bois de 2 ans.

Le soutien des charpentières par des perchettes est indispensable si elles ne sont pas ceinturées.

Eclaircissage

Il est de faible à très faible intensité surtout les premières années : il consiste le plus souvent à un simple dégrappage. Il sera réalisé tardivement en une seule opération.

Taille en vert

La taille en vert est nécessaire et indispensable ; elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration des fruits.

Alimentation hydrominérale

La fertilisation azotée devra être particulièrement soutenue pendant la période de croissance des pousses feuillées (mai - juin) afin d'éviter le blocage des arbres.



Récolte

La maturité est groupée : 3 à 4 passages échelonnés.

Potentiel de production

Le risque pour cette variété est de produire des fruits de trop gros calibre.

Le potentiel de production est proche de 40 à 50 tonnes, avec un poids moyen de l'ordre de 190 - 200 g (AA 40 à 60%, A 40 à 50 %, AAA 10 %). Le pourcentage de calibre A et + doit être de l'ordre de 80 à 90 %. Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 250 à 260 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

NECTAPOM® Nectapink cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsque celles-ci sont liées aux automnes doux et à un déficit de froid en hiver.

Le fruit est peu sensible aux maladies de conservation et à la fente du noyau.

La coloration de l'épiderme s'améliore au fur et à mesure des passages de récolte.

Appréciation

NECTAPOM® Nectapink cov est une variété à fort potentiel de charge et de calibre. Le fruit est attrayant, malgré une coloration bicolore, et de bonne qualité gustative.

Il faudra néanmoins s'attacher à maintenir la vigueur des arbres et limiter le potentiel de calibre des fruits.

Cette variété est mieux adaptée aux zones méridionales de production.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2016	06/08/2016	Epoque NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2015	15/08/2015	Epoque NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/07/2014	05/08/2014	3 à 5 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/08/2013	17/08/2013	3 à 5 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2012	17/08/2012	4 à 6 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/07/2011	30/07/2011	1 à 3 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	09/08/2010	19/08/2010	1 à 3 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/07/2009	07/08/2009	1 à 3 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/07/2008	04/08/2008	Epoque NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2007	07/08/2007	Epoque NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/07/2017	14/08/2017	1 à 3 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/08/2016	15/08/2016	Epoque NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2015	23/08/2015	5 à 7 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2014	09/08/2014	3 à 5 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/08/2013	25/08/2013	4 à 6 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/08/2012	21/08/2012	3 à 5 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2011	10/08/2011	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/08/2010	23/08/2010	Epoque NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2009	16/08/2009	2 à 4 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran	28/07/2008	21/08/2008	Epoque NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/07/2007	02/08/2007	Epoque NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/08/2017	13/08/2017	Epoque NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/08/2016	22/08/2016	Epoque NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2015	25/08/2015	2 à 4 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/08/2014	18/08/2014	3 à 5 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2013	08/09/2013	1 à 3 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

