

NECTAPOM® Nectaroyal COV

EPOQUE DE MATURITE :

22 à 24 jours après NECTAROSS cov, du 20/08/2017 au 31/08/2017, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

23 à 25 jours après NECTAROSS cov, du 20/08/2017 au 31/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

24 à 26 jours après NECTAROSS cov, du 25/08/2017 au 08/09/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV : 0743


Certification : En cours

COV Communautaire : EU 21907

N° Editeur : ASF 02.07

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Moyenne à forte



Le fruit

Le fruit est de forme ovale à arrondie, régulier.
La coloration rouge grenat à rouge (90 à 60 %) est lumineuse. La couleur de fond est jaune à jaune orangé.
L'épiderme est épais et parfois pigmenté en fonction de la charge des arbres.
Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.
La résistance aux manipulations est très bonne et autorise des récoltes espacées.
La qualité gustative est bonne à très bonne.
La texture est croquante et la saveur semi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			10 13
Acidité (meq/100ml)		6 9	
Arômes			

(*) IR pimprénelle



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les excès de vigueur au cours des premières années qui retardent la mise à fruit
- d'être en sous-charge
- une conduite en branches directes

Elle apprécie :

- les attachages de coursonnes et bois de 2 ans
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- une attention particulière afin de limiter le potentiel de calibre
- un ceinturage des arbres ou la pose de perchettes
- une taille tardive après une pré-taille de fin d'été

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la taille allongée, un écartement de 3.5 m sur le rang est préférable pour une conduite en gobelet ou double Y et assurer un vieillissement satisfaisant.

Un porte-greffe vigoureux peut s'avérer indispensable pour maintenir la vigueur de l'arbre.

Taille de formation

Elle est de type classique pour les variétés à port érigé. Les écimages sont indispensables pour une conduite en gobelet. Par la suite, le mode «taillé - tiré» convient parfaitement et évite de pratiquer des coupes d'ouverture trop fortes.

Les sous-mères s'installent facilement, mais ce n'est pas le cas des coursonnes ; on utilisera les rameaux vigoureux et/ou bois de 2 ans.

La mise à fruit étant plutôt lente sur cette variété, il faudra éviter les grosses coupes qui la retardent.

La charge des arbres et le poids moyen élevé des fruits ont tendance à affaïsser les charpentières : par mesure de précaution il est possible de «ceinturer» l'arbre s'il est conduit en gobelet ou double Y, mais il faut le faire avant la déformation des charpentières. En fait, il est préférable d'attacher des charpentières opposées, 2 par 2, ce qui leur évite de glisser latéralement, comme cela se produit souvent dans un simple ceinturage. A défaut, il faudra prévoir de soutenir les charpentières par des perchettes.

Taille de fructification

Il faudra pratiquer une taille allongée.

Les bois de 2 ans ont tendance à repercer en émettant de beaux rameaux mixtes, mais aussi de petites productions. La taille consistera à garder en alternance des rameaux mixtes qui ont une floribondité moyenne et les petites productions très fertiles. Le rameau mixte situé en extrémité du bois de 2 ans est toujours de très bonne qualité : dans la mesure du possible, il faudra le conserver.

Eclaircissage

Il est de faible à très faible intensité surtout les premières années : il consiste le plus souvent à un simple dégrappage. Il sera réalisé tardivement en une seule opération.

Taille en vert

La taille en vert est nécessaire et indispensable ; elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration des fruits.

Alimentation hydrominérale

La fertilisation azotée devra être particulièrement soutenue pendant la période de croissance des pousses feuillées (mai - juin), afin d'éviter le blocage des arbres.



Récolte

La maturité est groupée : 2 à 3 passages très échelonnés.

Potentiel de production

Il est proche des 40 à 50 tonnes voire plus avec un poids moyen de l'ordre de 190 - 200 g (AA 50 à 60 %, A 40 à 50 %, AAA 10 à 20 %). Le pourcentage de calibre A et + doit être de l'ordre de 80 à 90 %. Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 250 à 260 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

NECTAPOM® Nectaroyal n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsque celles-ci sont liées aux automnes doux et à un déficit de froid en hiver.

Le fruit est peu sensible aux maladies de conservation et à la fente du noyau. En cas de sous charge, il peut être très ponctué.

Appréciation

NECTAPOM® Nectaroyal cov est une variété à très fort potentiel agronomique lorsque les arbres sont équilibrés. La fermeté exceptionnelle du fruit autorise des cueillettes espacées qui permettent de réduire le nombre de passages.

Il faudra néanmoins s'attacher à maintenir la vigueur des arbres et à limiter le potentiel de calibre des fruits.

Cette variété est mieux adaptée aux zones méridionales de production.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2017	31/08/2017	22 à 24 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2016	29/08/2016	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2015	30/08/2015	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2014	16/08/2014	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/08/2013	31/08/2013	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/08/2012	27/08/2012	14 à 16 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/08/2011	18/08/2011	19 à 21 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/08/2010	29/08/2010	7 à 9 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2009	16/08/2009	10 à 12 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2008	16/08/2008	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/08/2007	20/08/2007	9 à 11 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2017	31/08/2017	23 à 25 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2016	03/09/2016	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2015	03/09/2015	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/08/2014	19/08/2014	14 à 16 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2013	10/09/2013	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2012	02/09/2012	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/08/2011	24/08/2011	7 à 9 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/08/2010	08/09/2010	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/08/2009	31/08/2009	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2008	25/08/2008	9 à 11 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/08/2007	21/08/2007	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2017	08/09/2017	24 à 26 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	27/08/2016	10/09/2016	17 à 19 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/08/2015	02/09/2015	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/08/2014	26/08/2014	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/09/2013	18/09/2013	15 à 17 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/08/2010	05/09/2010	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/08/2009	31/08/2009	11 à 13 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/08/2008	31/08/2008	13 à 15 jours après NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2007	25/08/2007	10 à 12 jours après NECTAROSS cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

