

NECTAPOM® Nectareine COV

EPOQUE DE MATURITE :

12 à 14 jours après NECTAROSS cov, du 28/07/2019 au 10/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV Communautaire : EU 21910 N° Etude : ASF 99.02

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Basitone, demi-érigé à érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, régulier, avec une cuvette ou un petit mucron sur le sommet.

La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge orangé (40 à 90 % de la surface) est lumineuse à très lumineuse. Cette coloration apparaît tardivement à l'approche de la maturité.

La couleur de fond est jaune orangé.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne à importante. Le noyau est de taille moyenne, adhérent.

La fermeté est très bonne et évolue lentement, autorisant des récoltes espacées.

La texture est croquante, de type BIG TOP®.

La qualité gustative est bonne.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 13
Acidité (meq/100ml)	6	9	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- une production sur rameaux mixtes verticaux ou érigés
- une conduite en branches directes
- les récoltes anticipées qui nuisent à la qualité de ses fruits

Elle apprécie :

- une sélection draconienne de ses rameaux lors de la taille d'hiver
- les attachages de coursonnes
- les tailles en vert qui favorisent la coloration de ses fruits

La conduite

Distances de plantation

Il n'y a pas lieu d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux et une distance moyenne de 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou double Y.

Taille de formation

La formation ne doit pas poser de problèmes majeurs : l'arbre s'ouvre facilement, à condition de réaliser des écimages en été lors de la première pousse et, au moins, en début de deuxième. L'installation des sous mères se fait par la taille et en complément par attachage. L'installation de coursonnes est facile : les nombreuses productions portées sur ce type d'organe sont généralement de bonne qualité.

Taille de fructification

La forte vigueur des arbres, combinée à une floribondité relativement faible, ne favorise pas une mise à fruit rapide. Une pré-taille est indispensable pour éliminer les bois de deux ans érigés. Certains d'entre eux, parmi les plus latéraux, pourront cependant être attachés en position horizontale, en particulier pour (re)constituer des coursonnes. Les organes de production de prédilection (petites pousses de 5 à 10 cm) sont portés sur des bois de 2 ans peu vigoureux, horizontaux, mais non affaiblis, c'est-à-dire portant un rameau mixte en position terminale. Cette sélection peut être complétée par des rameaux mixtes lorsqu'ils ne sont pas en position érigée.

Eclaircissage

Il est généralement d'intensité de très faible à faible et sera réalisé, si nécessaire, en une seule opération généralement assez tardivement (chute de fruits). Il peut être précédé par une intervention au sécateur qui supprimera les productions faibles oubliées ou conservées par assurance, lors de la taille de fructification.

Taille en vert

La taille en vert est indispensable : elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration du fruit.

Potentiel de production

Elle peut être estimée à 40-45 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 160-180 g (AA 50 %, A 30 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 250 000 à 260 000 par hectare.

Le déclenchement de la date optimale de récolte peut poser quelques difficultés, compte tenu de la texture du fruit. Afin d'éviter toutes erreurs préjudiciables, il est conseillé d'utiliser des appareils de mesure de la fermeté.

Sensibilités particulières

NECTAREINE® est sensible aux chutes de bourgeons liées à un déficit en froid hivernal. Des fruits portés sur des rameaux forts érigés peuvent chuter tardivement (juin).

Les fruits sont moyennement à sensibles aux maladies de conservation.

Appréciation

NECTAREINE® est une variété de saison à fort potentiel de calibre. La fermeté qui évolue lentement et la sensation « d'élasticité » du fruit au toucher compliquent la détermination de la date optimale de début de récolte. Le choix des fruits par les cueilleurs doit être déterminée par la coloration des fruits. Le nombre de passages de récolte est limité.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/08/2018	16/08/2018	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2017	30/07/2017	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/07/2016	05/08/2016	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/07/2015	02/08/2015	13 à 15 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/07/2014	22/07/2014	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/07/2013	05/08/2013	8 à 10 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/07/2012	04/08/2012	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/07/2011	26/07/2011	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2010	13/08/2010	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/07/2009	01/08/2009	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2008	30/07/2008	4 à 6 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2007	02/08/2007	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/07/2019	10/08/2019	12 à 14 jours après NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2018	12/08/2018	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/07/2017	10/08/2017	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2016	06/08/2016	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2015	12/08/2015	2 à 4 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2014	28/07/2014	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2013	16/08/2013	5 à 8 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/07/2012	10/08/2012	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2011	29/07/2011	15 à 17 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2010	18/08/2010	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/07/2009	03/08/2009	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran	22/07/2008	04/08/2008	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2007	31/07/2007	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/07/2006	08/08/2006	12 à 13 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/08/2018	18/08/2018	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2017	03/08/2017	15 à 17 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/08/2016	13/08/2016	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/08/2015	14/08/2015	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2014	07/08/2014	4 à 6 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/08/2013	19/08/2013	15 à 17 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2012	14/08/2012	14 à 16 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2011	07/08/2011	1 à 3 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/08/2010	21/08/2010	2 à 4 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/07/2009	20/08/2009	6 à 8 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	28/07/2008	11/08/2008	6 à 8 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2007	13/08/2007	4 à 6 jours avant NECTAROSS cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/08/2006	28/08/2006	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
---	------------	------------	-----------------------------------

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP/CEP/INRA/CTIFL et stations régionales.

