

REGALSUN® Allredal cov

EPOQUE DE MATURITE :

6 à 8 jours après SUMMER RICH cov, du 18/07/2016 au 28/07/2016, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

6 à 8 jours après SUMMER RICH cov, du 20/07/2016 au 31/07/2016, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

2 à 4 jours après SUMMER RICH cov, du 27/07/2016 au 07/08/2016, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France


EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV : 0901

N° Etude : ASF 01.41

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : Irrégulière
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne, 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme arrondie à ovale, légèrement dissymétrique.

La coloration rouge vif à rouge orangé (80 à 95 % de la surface) est lumineuse.

La couleur de fond est jaune orangé.


L'épiderme est épais.

Le noyau est de petite taille, semi-adhérent.

La texture est fine, juteuse.

La fermeté est bonne.

La qualité gustative est bonne à très bonne, la saveur équilibrée.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10 12	
Acidité (meq/100ml)		13	16
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée trop verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre

Elle apprécie :

- une aide pour ouvrir ses charpentières
- une aide pour créer des coursonnes
- la taille en vert avant récolte

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur naturelle de l'arbre, il est inutile de l'associer à un porte-greffe vigoureux, sauf impératif agronomique.

Une distance de 3.5 m voire plus entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou double Y.

Taille de formation

Elle nécessitera une attention particulière les premières années : les écimages d'été sont indispensables sur jeunes arbres pour favoriser leur ouverture.

L'arbre peut être conduit en « taillé-tiré », si l'on veut obtenir un gobelet ouvert. L'arbre coursonne difficilement et il faut veiller à l'aider dans ce domaine, quitte à procéder à des arcures de rameaux vigoureux ou de bois de deux ans. L'installation des sous-mères est également difficile et il est parfois nécessaire de récupérer des gourmands pour les installer.

Taille de fructification

Les rameaux mixtes sont de bonne qualité lorsqu'ils sont en extrémité de coursonnes. Les autres sont de couleur rouge ou verte même, si la taille en vert est bien faite et ils ont tendance à s'affaisser sous la charge et à donner un seul repercement dans leur prolongement ; beaucoup d'entre eux s'annulent.

La taille est de type allongé avec installation de coursonnes, ce qui est nécessaire pour pérenniser les rameaux mixtes. Il faut conserver des rameaux vigoureux en les inclinant par attachage, afin de créer de nouvelles coursonnes.

La taille d'été ne peut pas être négligée.

La pré-taille est très utile pour supprimer ou raccourcir des bois de deux ans verticaux et éclairer l'arbre.

Eclaircissage

Il est d'intensité faible à moyenne ; il peut être réalisé en une seule fois et de façon rigoureuse.

Si cela est possible, il sera qualitatif en éliminant les fruits dans les parties basses et ombrées de l'arbre.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 35-40 tonnes par ha produites pour un poids moyen de fruit de 180 g (AA 50 %, A 40 %, B 10 %). Le nombre de fruits objectif avoisine donc les 220 000 à l'ha dans de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

REGALSUN® Allredal cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit de froid hivernal.

L'arbre a une nette tendance à se dénuder et à « vieillir » prématurément.

Le fruit ne paraît pas sensible aux maladies de conservation.



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Appréciation

REGALSUN® Allredal cov est une variété productive dont les fruits sont très attrayants et de très bonne qualité gustative.

La fermeté du fruit est bonne, mais la récolte est groupée, ce qui en fait une variété « courte ».

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	18/07/2016	28/07/2016	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	18/07/2015	28/07/2015	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/07/2014	14/07/2014	Epoque SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/07/2013	05/08/2013	4 à 6 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2012	30/07/2012	1 à 3 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	13/07/2011	25/07/2011	4 à 6 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2010	06/08/2010	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2009	25/07/2009	1 à 3 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/07/2008	31/07/2008	5 à 7 jours après SUMMER RICH cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/07/2007	29/07/2007	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2016	31/07/2016	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2015	31/07/2015	3 à 5 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/07/2014	23/07/2014	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	31/07/2013	14/08/2013	4 à 6 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/07/2012	31/07/2012	0 à 2 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2011	24/07/2011	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/07/2010	12/08/2010	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2009	29/07/2009	1 à 3 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2008	02/08/2008	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/07/2007	27/07/2007	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2006	05/08/2006	7 à 9 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	27/07/2016	07/08/2016	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/08/2015	18/08/2015	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/07/2014	02/08/2014	6 à 8 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/08/2013	18/08/2013	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines	24/07/2012	06/08/2012	Epoque SUMMER RICH cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/07/2011	28/07/2011	Epoque SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	27/07/2010	09/08/2010	Epoque SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/07/2009	02/08/2009	3 à 5 jours avant SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/07/2008	31/07/2008	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/07/2007	30/07/2007	2 à 4 jours après SUMMER RICH cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/08/2006	14/08/2006	4 à 6 jours après SUMMER RICH cov



