

NECTASWEET® Nectarlove COV

EPOQUE DE MATURITE :

2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov, du 14/07/2019 au 26/07/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

EMERAUDE® Monnude cov, du 02/08/2019 au 12/08/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTIONS FRUITS S.A.S., France

N° Editeur : ASF 07.26

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé à érigé
- Qualité du bois : Bonne à très bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Très forte



Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, assez régulier.

La coloration, rouge grenat à rouge (60 à 90% de la surface), est unie et moyennement lumineuse.

La couleur de fond est verte à blanc crème.

L'épiderme est épais.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La résistance aux manipulations est très bonne.

La qualité gustative est bonne et la saveur est douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12
Acidité (meq/100ml)	6	8	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les rameaux forts dans le haut des arbres
- les récoltes anticipées qui nuisent à la coloration des fruits

Elle apprécie :

- un éclaircissage précoce et rigoureux
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- une retaille après récolte qui favorise les beaux rameaux mixtes

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur de l'arbre, des distances de 3 à 3.5 mètres entre arbres sont suffisantes pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Il est inutile d'associer cette variété à un porte greffe vigoureux, sauf cas particuliers.

Taille de formation

Les charpentières sont érigées, il est donc impératif de réaliser des écimages en 1ère et 2ème année. Il faudra parfois recourir à des artifices si l'on veut les incliner. Comme pour toutes les nectarines ou brugnons présentant ce type d'arbre, une conduite en mode « taillé-tiré » convient bien.

Il faudra veiller à installer les coursonnes et à les renouveler.

Taille de fructification

Elle sera réalisée sur rameaux mixtes et/ou tous types de bois. Les rameaux insérés directement et verticalement sur les charpentières sont floribonds et présentent une bonne répartition des fleurs.

Les rameaux en prolongement de bois de deux ans sont également de bonne qualité et peuvent être conservés si nécessaire (suite à une forte charge, par exemple).

Eclaircissage

La forte floribondité et le fort taux de nouaison permettent de réaliser un pré-éclaircissage par dégrappage qui permettra de soulager provisoirement les arbres. La suppression de la partie terminale des rameaux est également recommandée (cette opération doit être qualitative car adaptée à la qualité des rameaux : les rameaux fins sont réduits de leur moitié, seul le 1/3 supérieur des rameaux de qualité est supprimé).

Par la suite, l'éclaircissage est classique. Il est réalisé en une seule opération, sur jeunes fruits. Il est à la fois quantitatif et qualitatif, en privilégiant les fruits portés par les beaux rameaux mixtes.

Il est recommandé de réaliser des comptages après éclaircissage afin de s'assurer du nombre de fruits conservés.

Alimentation hydrominérale

La fertilisation doit être adaptée au développement des arbres et à la charge en fruits conservés.

Récolte

3 à 4 passages espacés, la fermeté du fruit évolue lentement.

Potentiel de production

La mise à fruit est très rapide.

Il peut être estimé à 30-35 tonnes par ha, voire plus, pour un poids moyen de fruit de 160-170 g minimum (A 50 %, AA 30 %, B 20 %). Le nombre de fruits objectif sera compris entre 208 et 220 000 à l'hectare.

Sensibilités particulières

NECTASWEET® Nectarlove cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un automne "chaud" et/ou à déficit en froid hivernal.

Le fruit n'est pas sensible au cracking de l'épiderme, à la fente du noyau, mais il est sensible au boisage.

Il ne semble pas sensible aux maladies de conservation.

Appréciation

NECTASWEET® Nectarlove cov est une variété rustique qui se caractérise par une mise à fruit rapide. Son potentiel de production et de calibre est très important à son époque de maturité.

La coloration de l'épiderme est très soutenue, mais la présentation du fruit se rapproche parfois de celle de la variété MAGIQUE®, en particulier pour la couleur de fond.

Les auteurs attirent l'attention du lecteur sur le fait que les observations transcrites sur cette fiche ont été réalisées sur de jeunes arbres. Cette fiche sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2018	24/07/2018	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2017	20/07/2017	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2016	27/07/2016	7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2015	25/07/2015	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/07/2014	18/07/2014	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2013	30/07/2013	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2012	25/07/2012	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/07/2011	19/07/2011	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2019	26/07/2019	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2018	31/07/2018	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/07/2017	26/07/2017	8 à 10 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2016	28/07/2016	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/07/2015	31/07/2015	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2014	31/07/2014	10 à 12 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/07/2013	12/08/2013	8 à 10 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/07/2012	31/07/2012	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2011	25/07/2011	9 à 11 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/08/2019	12/08/2019	EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/07/2018	31/07/2018	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/07/2017	30/07/2017	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/07/2016	28/07/2016	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/07/2015	04/08/2015	7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines	18/07/2014	03/08/2014	7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/08/2013	20/08/2013	7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/07/2012	04/08/2012	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/07/2011	23/07/2011	2 à 4 jours après EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FPNF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

