

# GYPSE® Mongros cov

## EPOQUE DE MATURITE :

26 à 28 jours avant ONYX® Monalu cov , du 01/06/2019 au 12/06/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : En demande

Clone INFEL® : 7641

N° Etude : 966

N° Editeur : SF 99-108

## L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : L'arbre est peu ramifié avec une tendance à se dégarnir.
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Il est de forme ronde, régulier à maturité.


La coloration (80 à 90 %) rouge foncé à rouge rosé de l'épiderme est assez lumineuse.

La fermeté est bonne, mais évolue rapidement.

Le noyau est petit, semi-adhérent. L'épiderme est d'épaisseur moyenne.

La qualité gustative est bonne, avec une acidité marquée, mais compensée par un indice réfractométrique correct.

Le fruit ne présente pas d'arrachement pédonculaire lors de la récolte qui est très groupée.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 11	
Acidité (meq/100ml)		14	16
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les rameaux faibles qui ne permettent pas d'induire du calibre
- les productions portées par des rameaux sans accroissement terminal

Elle apprécie :

- les beaux rameaux mixtes
- la retaille après récolte à laquelle elle réagit très bien

GYPSE® est une variété très précoce d'assez bon calibre pour l'époque et dont l'arbre nécessite une bonne technicité.

## La conduite

### Distances de plantation

GYPSE® peut être associée à un porte-greffe vigoureux. A cette exception près, une distance de 3 m entre arbres suffit pour une conduite en gobelet ou double Y.

### Taille de formation

Du fait du port de la variété, elle ne pose pas de problème. L'arbre s'ouvre aisément et les sous-mères s'installent facilement. Compte tenu de la précocité, les risques d'écrasement des charpentières sont faibles. L'arbre a tendance à se dégarnir par manque de reperçements.


### Taille de fructification

Les rameaux mixtes sont trapus et d'excellente qualité, peu pourvus en anticipés. Il faut conserver exclusivement les plus beaux, quelle que soit leur position, parce que l'on a pas toujours le choix de leur insertion.

Ils peuvent être insérés en prolongement d'un bois de deux ans et si la coursonne est trop longue, elle sera attachée. Il en est de même des rameaux vigoureux et verticaux.

Très souvent les rameaux les plus intéressants sont issus de la taille après récolte. C'est pourquoi cette dernière est indispensable à la réussite de cette variété.

Les coursonnes vieillissantes ne sont jamais coupées à ras pour conserver une possibilité de reperçement.



1 Les rameaux de qualité inférieure ou anticipés sont supprimés

2 Beau rameau de prolongement : il est conservé

3 Emplacement de la taille après récolte

4 Rameaux renforcés par la taille d'été de bonne qualité et correspondant à l'objectif pour cette variété

### Eclaircissage

Il est souvent important et doit être pratiqué très tôt. Il peut débuter par une retaille de l'extrémité des rameaux (faite à bouton rose ou en début de floraison, pour s'assurer de la floribondité), accompagnée ou non d'un effleurage.

L'éclaircissage sur jeunes fruits est classique et réalisé en une seule opération, s'il y a eu intervention en floraison.

## Potentiel de production

Il peut être estimé à 15-20 tonnes par ha pour un poids moyen de 130 g par fruit si les rameaux sont d'excellente qualité (B 60 à 70 %, A 20 %, C 10 à 20 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 150 000 par ha environ.

## Sensibilités particulières

GYPSE® est assez sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Elle est très peu sujette à la fente du noyau.

## Appréciation

GYPSE® Mongros cov présente des caractéristiques agronomiques et qualitatives intéressantes pour son époque de maturité. La teneur en acides du fruit est élevée et doit être compensée par un bon indice réfractométrique.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/05/2017	06/06/2017	23 à 25 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/06/2016	16/06/2016	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/06/2015	16/06/2015	16 à 18 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/05/2014	02/06/2014	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/06/2013	18/06/2013	18 à 20 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/06/2012	12/06/2012	26 à 28 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/05/2011	04/06/2011	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/06/2010	20/06/2010	21 à 23 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/05/2009	08/06/2009	23 à 25 jours avant ONYX® Monalu cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/05/2007	08/06/2007	20 à 22 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/06/2019	12/06/2019	26 à 28 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/06/2018	13/06/2018	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/05/2017	08/06/2017	18 à 20 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/05/2016	09/06/2016	18 à 20 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/06/2015	12/06/2015	26 à 28 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/05/2014	06/06/2014	20 à 22 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/06/2013	25/06/2013	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	31/05/2012	12/06/2012	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/05/2011	07/06/2011	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/06/2010	18/06/2010	22 à 24 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/05/2009	08/06/2009	23 à 25 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran	03/06/2008	13/06/2008	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/05/2007	05/06/2007	21 à 23 jours avant ONYX® Monalu cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/06/2006	12/06/2006	21 à 23 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/06/2017	19/06/2017	16 à 18 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/06/2016	14/06/2016	16 à 18 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/06/2015	23/06/2015	20 à 22 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/06/2014	11/06/2014	21 à 23 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/06/2013	05/07/2013	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/06/2011	12/06/2011	20 à 22 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/06/2009	19/06/2009	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/06/2008	16/06/2008	19 à 21 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/06/2007	11/06/2007	20 à 22 jours avant ONYX® Monalu cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/06/2006	23/06/2006	17 à 19 jours avant ONYX® Monalu cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

