

JULY STAR® Bracid cov

EPOQUE DE MATURITE :

7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov, du 20/07/2012 au 30/07/2012, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

14 à 16 jours après EMERAUDE® Monnude cov, du 24/07/2012 au 02/08/2012, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENTEUR(S) : N. G. BRADFORD et L. G. BRADFORD, LE GRAND, CALIFORNIE, Etats Unis

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV Communautaire : EU 11979 N° Editeur : SF 94-015

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, érigé à très érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Faible, 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ovale, régulier.

La coloration rouge grenat à rouge rosé (95 à 60% de la surface) est lumineuse. Elle a tendance à diminuer au fil des récoltes.

La couleur de fond est blanc crème à crème.

L'épiderme est épais, parfois pigmenté.

Le noyau, de taille moyenne à grosse, est adhérent.

La fermeté est bonne, mais a tendance à évoluer rapidement.

La qualité gustative est bonne, avec une saveur très acidulée dans les premiers passages, mais qui a tendance à diminuer au fil des récoltes.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12
Acidité (meq/100ml)			16 20
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être taillée trop précocement, avant que l'on discerne sa floribondité
- être oubliée lors de la taille d'été

Elle apprécie :

- par-dessus tout la lumière et l'aération
- que ses rameaux mixtes soient insérés sur coursonnes
- une taille allongée

JULY STAR® est une variété dont l'arbre est très érigé et de mise à fruit rapide.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur et de l'époque de maturité, une distance moyenne de 3.5 m sur le rang en situation poussante est un bon compromis.

Taille de formation

La difficulté réside dans le port de l'arbre dont le bois est à la fois érigé et rigide. Les charpentières sont assez fines. Les écimages d'été sont indispensables si l'on veut obtenir un gobelet ouvert mais sont insuffisants. Dans la plupart des situations, ils devront s'accompagner d'attachages destinés à parfaire l'ouverture. Les sous-mères elles mêmes se redressent et doivent être attachées entre elles.

Une formation en mode taillé-tiré convient très bien pour l'obtention d'un gobelet ouvert.

Taille de fructification

La taille est de type allongé.

Le bois est de qualité très moyenne, les rameaux sont fins et peu floribonds, particulièrement lorsqu'ils sont en insertion directe.

Comme pour toutes les variétés à port érigé, une pré-taille est utile pour supprimer les bois de deux ans verticaux et trop forts.

Les coursonnes s'installent difficilement et il faut procéder par arcures et attachages de bois de deux ans.

La taille en vert est indispensable pour favoriser la coloration de l'épiderme.

Eclaircissage

Il est généralement peu important et peut être réalisé en une seule opération. Il peut être précédé par une intervention de taille qui supprime les productions faibles, oubliées ou laissées par assurance lors de la taille d'hiver.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 25 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 160 g (A 60 %, B 20 %, AA 20 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc voisin de 160 000 par hectare. Du fait de la qualité moyenne du bois porteur, la répartition du calibre est dispersée.



Sensibilités particulières

JULY STAR® Bracid cov n'est pas ou peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont consécutives à un déficit en froid hivernal.

Le fruit est sensible à la fente du noyau.

Appréciation

JULY STAR® Bracid cov se caractérise par un fruit de caractère, à la fois acidulé, sucré et aromatique.

Le maintien du calibre ne pourra être obtenu que par des conditions de culture performantes.

Du fait de l'acidité marquée du fruit, il est important de ne pas anticiper le déclenchement de la récolte.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2012	30/07/2012	7 à 9 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	09/07/2011	19/07/2011	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2010	06/08/2010	5 à 7 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2009	25/07/2009	8 à 10 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	13/07/2008	23/07/2008	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/07/2012	02/08/2012	14 à 16 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2011	05/08/2011	16 à 18 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/07/2010	12/08/2010	8 à 10 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/07/2009	30/07/2009	8 à 10 jours après EMERAUDE® Monnude cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2008	31/07/2008	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/07/2007	25/07/2007	3 à 5 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/07/2006	28/07/2006	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP/CEP/INRA/CTIFL et stations régionales.

