

TIFANY cov

EPOQUE DE MATURITE :

7 à 9 jours avant ZEPHYR® Monphir cov, du 27/07/2019 au 06/08/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

1 à 3 jours après ZEPHYR® Monphir cov, du 12/08/2019 au 22/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

ZEPHYR® Monphir cov, du 13/08/2019 au 26/08/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENITEUR(S) : PHILIPPE et STEPHANE BUFFAT, FRANCE,

EDITEUR : PSB PRODUCCION VEGETAL S.L.,

COV Communautaire : 2010/2743 N° Editeur : 4050.01 NB

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Intermédiaire à basitone, demi-érigé
- Débourrement : D'époque demi-précoce
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre linéaire
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde à ronde aplatie, régulier, avec une cuvette sur le sommet.

La coloration de l'épiderme (90 à 100 % de la surface) rouge grenat à rouge rosé est lumineuse.

La couleur de fond est verte à blanc crème.

L'épiderme est épais, parfois très légèrement pigmenté.

Le noyau est gros, libre.

La fermeté est bonne et a tendance à évoluer lentement.

La texture est fine.

La qualité gustative est bonne, la saveur demi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9	12
Acidité (meq/100ml)	6	9	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être oubliée par les écimages de formation
- les charpentières conduites en branches directes
- les rameaux mixtes en insertion directe

Elle apprécie :

- une aide pour établir les sous-mères
- un renouvellement rapide des coursonnes
- une attention particulière pour déterminer la date de récolte des fruits

La conduite

Distances de plantation

Une distance de plantation de l'ordre de 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou double Y.

Sauf cas particulier, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

Les écimages d'été sont indispensables les premières années pour obtenir un gobelet ouvert. Dans la plupart des cas, ils devront s'accompagner d'attachages destinés à parfaire l'ouverture (mode taillé-tiré).

L'installation des sous-mères est naturellement difficile, des rabattages et/ou des attachages sont indispensables. L'établissement de coursonnes doit se faire au sécateur et plus généralement par attachage de bois de deux ans vigoureux. Leur renouvellement doit être systématique, en particulier lorsqu'ils sont issus de rameaux mixtes peu vigoureux car ils s'annulent très rapidement (aucun repercement).

Taille de fructification

Cette variété nécessite une taille semi-allongée : elle sera réalisée sur rameaux mixtes et bois de 2 ans non affaiblis. Le repercement des rameaux sur bois de 2 ans est difficile : il s'agit, le plus souvent, de petites productions accompagnées (ou non) de bouquets de mai ; le rameau terminal est de bonne qualité.

La qualité des rameaux mixtes est bonne ; ils sont généralement de bon calibre.

Eclaircissage

Il est généralement de moyenne intensité et doit être réalisé à une époque moyenne à tardive en une seule opération. En aucun cas, il ne faudra être en sous-charge : il est donc nécessaire de veiller à conserver un nombre important de fruits par arbre afin de limiter le calibre des fruits.

Il peut être précédé par une intervention au sécateur qui permettra de supprimer les productions faibles oubliées ou conservées par assurance lors de la taille de fructification.

Taille en vert

Elle est indispensable, car elle favorisera la qualité des rameaux, la coloration des fruits et l'aération du verger qui permet de limiter les conditions favorables au développement de maladies de conservation.

Alimentation hydrominérale

Compte tenu du potentiel de charge et de calibre de la variété, une alimentation soutenue est souhaitable.

Récolte

La fermeté des fruits évolue lentement et permet des récoltes espacées, mais complique singulièrement la détermination de la date de déclenchement de la récolte.

La récolte sera effectuée pour chaque passage lorsque l'on trouve des fruits « souples » au toucher.

Potentiel de production

L'objectif sera d'atteindre, en répartition de calibre, au moins 80 % de la production dans les calibres A et plus. Le potentiel peut être estimé au moins à 40-45 tonnes par ha pour un poids moyen recherché de 170 à 180 g par fruit correspondant à un calibre AA -A ou A-AA dominant . Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 200 à 226 000 environ pour un verger de vigueur normale et dans de bonnes conditions de culture.

Cette variété a tendance à sur calibrer, c'est pourquoi il est indispensable de laisser des charges (nombre de fruits) conséquentes.

Sensibilités particulières

TIFANY cov est peu ou pas sensible aux chutes de bourgeons lorsque celles-ci sont liées à un automne "chaud" et/ou un déficit en froid hivernal.

Cette variété présente le risque de voir son bois « vieillir » prématurément.

Les fruits sont peu sensibles aux maladies de conservation. Leur épiderme ne paraît pas sensible au flétrissement en cas de pluie précédant la récolte.

Appréciation

TIFANY cov est une variété semi-tardive, à très fort potentiel de charge et de calibre. Le fruit est attrayant et de bonne qualité gustative.

Le potentiel de calibre et de coloration atteint précocement nuit à la bonne détermination du déclenchement de la récolte, d'autant plus que la fermeté des fruits évolue lentement. En revanche, elle autorise des récoltes espacées.

Les auteurs attirent l'attention du lecteur sur le fait que les observations transcrites sur cette fiche ont été réalisées sur de jeunes arbres. Cette fiche sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2019	06/08/2019	7 à 9 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/07/2018	02/08/2018	4 à 6 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/07/2017	04/08/2017	1 à 3 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2016	09/08/2016	2 à 4 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/07/2015	06/08/2015	7 à 9 jours avant ZEPHYR® Monphir cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/07/2014	31/07/2014	Epoque ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/08/2013	14/08/2013	5 à 7 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/08/2019	22/08/2019	1 à 3 jours après ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/08/2018	18/08/2018	Epoque ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2017	08/08/2017	5 à 7 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/07/2016	11/08/2016	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2015	10/08/2015	9 à 11 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/07/2014	03/08/2014	8 à 10 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2013	22/08/2013	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/08/2012	17/08/2012	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2011	05/08/2011	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/08/2010	16/08/2010	14 à 16 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/08/2019	26/08/2019	ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/08/2018	19/08/2018	1 à 3 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines	11/08/2017	28/08/2017	2 à 4 jours avant ZEPHYR® Monphir cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/08/2016	18/08/2016	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/08/2015	24/08/2015	2 à 4 jours après ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/08/2014	18/08/2014	1 à 3 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2013	03/09/2013	1 à 3 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2012	28/08/2012	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2011	09/08/2011	6 à 8 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2010	24/08/2010	11 à 13 jours avant ZEPHYR® Monphir cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

