

# CORINDON® Monjaune cov

## EPOQUE DE MATURITE :

9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov, du 25/08/2018 au 06/09/2018, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov, du 25/08/2018 au 08/09/2018, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : 13122


Clone INFEL® : 7644

N° Etude : 160.3

N° Editeur : SF 98-081

## L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : Le bois est souple
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque tardive
- Floribondité : Faible à moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Il est de forme ronde, aplati, légèrement triangulaire, coloré à 80 % en moyenne de rouge foncé à rouge orangé.

Le fruit est peu duveteux, mais de présentation assez terne.

L'épiderme est épais et le noyau gros et semi-adhérent.

La fermeté est bonne.

La qualité gustative est douce et sucrée. Elle est bonne, mais devient peu aromatique lorsque l'arbre est chargé.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12
Acidité (meq/100ml)	3	6	
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être à l'étroit dans ses distances de plantation
- être oubliée par la taille d'été

Elle apprécie :

- bénéficier d'une taille allongée ou sur bois de deux ans
- bénéficier d'une pré-taille en fin d'été.

## La conduite

### Distances de plantation

La variété étant de bonne vigueur une distance de 3.5 m voire plus entre arbres lui convient. Il est inutile de l'associer à un porte-greffe vigoureux, sauf cas particulier.

### Taille de formation

Elle ne pose pas de problème particulier du fait du port favorable de la variété. Les coursonnes s'étalent facilement et les sous-mères auront probablement tendance à s'effondrer rapidement.

Un mode de formation « taillé-tiré » convient bien pour une conduite en gobelet ouvert, mais l'ouverture ne doit pas être excessive. Il est probable qu'un soutien des charpentières sera nécessaire à terme.

### Taille de fructification

CORINDON® présente des analogies de taille avec celle de la variété O'HENRY : la floribondité est meilleure lorsque les rameaux sont insérés sur une coursonne intermédiaire ou, mieux, en prolongement de bois de deux ans. Le bois de taille est de qualité moyenne car les rameaux sont fins.

La taille sera donc de type bois de deux ans, ce qui va entraîner des contraintes au niveau de la taille d'été (pour l'éclaircissement et la coloration). La taille sera tardive, lorsque l'on pourra discerner les boutons floraux.

Une pré-taille sera nécessaire pour éliminer les coursonnes verticales ou mal placées.

### Eclaircissage

Il est classique ; de faible intensité et est réalisé en une seule opération. Le potentiel de calibre étant très important, il faut veiller à ne pas sur-éclaircir.

## Potentiel de production

Il peut être estimé à 40 tonnes par ha, pour un poids moyen recherché de 190 g par fruit (AA et plus 50 %, A 50 %). Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 210 à 220 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

## Sensibilités particulières

CORINDON® est très peu ou pas sensible aux chutes de bourgeons floraux lorsqu'il s'agit de manque de froid. Elle est sensible aux maladies de conservation dans des situations favorisantes.

## Appréciation

CORINDON® est une variété très rustique, à fort potentiel de charge et de calibre. Le fruit est de saveur douce et maintient bien sa jutosité.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2018	06/09/2018	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2017	07/09/2017	10 à 12 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/08/2016	05/09/2016	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/08/2015	05/09/2015	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2014	01/09/2014	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/09/2013	14/09/2013	10 à 12 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2012	04/09/2012	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2011	31/08/2011	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/09/2010	13/09/2010	1 à 3 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2009	04/09/2009	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2008	04/09/2008	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2007	03/09/2007	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Roussillon (66)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/08/2018	08/09/2018	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/08/2017	04/09/2017	12 à 14 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2016	09/09/2016	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2015	09/09/2015	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2014	31/08/2014	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2013	20/09/2013	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	31/08/2012	12/09/2012	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2011	04/09/2011	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2010	15/09/2010	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/08/2009	10/09/2009	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/08/2008	14/09/2008	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/08/2007	03/09/2007	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/09/2006	14/09/2006	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/09/2016	16/09/2016	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2015	15/09/2015	3 à 5 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/08/2014	04/09/2014	3 à 5 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/09/2013	22/09/2013	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2012	14/09/2012	4 à 6 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2011	31/08/2011	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/09/2010	20/09/2010	4 à 6 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/09/2009	17/09/2009	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/09/2008	16/09/2008	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/08/2007	15/09/2007	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/09/2006	20/09/2006	8 à 10 jours après O'HENRY® Mercil cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

