

# NECTAPOM® Nectariane COV

## EPOQUE DE MATURITE :

NECTAROSS cov, du 22/07/2019 au 02/08/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)  
12 0 14 jours avant NECTAROSS cov, du 28/07/2019 au 08/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV Communautaire : EU 21911 N° Etude : ASF 01.03

## L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Basitone, demi-érigé à érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, régulier.

La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge grenat (60 à 90 % de la surface) est lumineuse à très lumineuse. Cette coloration apparaît précocement. La couleur de fond est jaune orangé.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne à importante. Le noyau est de taille moyenne, adhérent. La fermeté est très bonne et évolue lentement autorisant des récoltes espacées.

La texture est dense et a tendance à être élastique à croquante, mais reste juteuse.

La qualité gustative est moyenne à bonne du point de vue aromatique, mais l'indice réfractométrique se maintient tout au long des récoltes.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 14
Acidité (meq/100ml)	6	8	
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- un mauvais choix des rameaux mixtes
- une conduite en branches directes
- les récoltes anticipées qui nuisent à la qualité des fruits
- les coursonnes affaiblies sur lesquelles les fruits ne peuvent pas exprimer leur calibre

Elle apprécie :

- une sélection draconienne des rameaux lors de la taille d'hiver
- les attachages de coursonnes et de bois de 2 ans
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits

## La conduite

### Distances de plantation

Il n'y a pas lieu d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux et une distance moyenne de 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet.

### Taille de formation

Elle est de type classique pour les variétés à port érigé. Les écimages sont indispensables pour une conduite en gobelet. Par la suite, le mode « taillé-tiré » convient parfaitement et évite de pratiquer des coupes d'ouverture trop fortes. La mise à fruit est rapide.

### Taille de fructification

Les bois de deux ans ont tendance à ne repercer qu'en extrémité et il y a affaiblissement rapide, voire disparition de ceux qui sont de qualité moyenne. Les bois de deux ans les plus beaux sont souvent semi-érigés (en relation avec le port de la variété) et ne peuvent être utilisés qu'après arcure. Il est en effet illusoire de vouloir les tailler, puisque la taille de cette variété consiste à garder les plus beaux rameaux mixtes et que ces derniers sont souvent positionnés en extrémité. Ils sont reconnaissables à leur couleur brune à leur base alors que les rameaux fins sont rouges. La taille « à la couleur » est efficace lorsqu'il s'agit de garder les bruns et supprimer les rouges.

### Eclaircissage

Il est généralement d'intensité moyenne et sera réalisé en une seule opération. Il peut être précédé par une intervention au sécateur qui supprimera les productions faibles oubliées ou conservées par assurance lors de la taille de fructification.

### Taille en vert

La taille en vert est nécessaire et indispensable : elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration du fruit.

## Potentiel de production

Le potentiel de production peut être estimé à 35-40 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit élevé de 170-180 g (au moins 80 % de A et plus).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 200 000 à 250 000 par hectare.

Comme pour NECTAPOM® 29 Nectareine, le déclenchement de la date optimale de récolte pour cette variété peut poser quelques difficultés, compte tenu de la texture du fruit qui évolue très lentement (cette particularité autorise par ailleurs des passages de récolte espacés). La mesure du taux de sucres n'est pas un indicateur pertinent (niveau relativement élevé) ; aussi, il est préférable d'utiliser des outils de mesure de la fermeté.

## Sensibilités particulières

NECTAPOM® Nectariane cov ne semble pas présenter de sensibilité particulière au niveau de l'arbre. Les fruits ne sont pas sensibles à la fente du noyau et peu sensibles aux maladies de conservation.

## Appréciation

NECTAPOM® Nectariane cov est une variété de saison à fort potentiel de production et de calibre présentant une excellente coloration des fruits. La fermeté qui évolue lentement et la sensation « d'élasticité » du fruit au toucher compliquent la détermination de la date optimale de début de récolte et le choix des fruits par les cueilleurs.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/07/2019	02/08/2019	NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2018	31/07/2018	11 à 13 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2017	30/07/2017	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/07/2016	03/08/2016	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/07/2015	04/08/2015	11 à 13 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2014	20/07/2014	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/07/2013	05/08/2013	8 à 10 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2012	04/08/2012	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/07/2011	20/07/2011	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2010	13/08/2010	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2009	30/07/2009	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/07/2008	03/08/2008	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2007	02/08/2007	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/07/2019	08/08/2019	12 0 14 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/07/2018	08/08/2018	11 à 13 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2017	10/08/2017	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/07/2016	02/08/2016	9 à 11 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2015	17/08/2015	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2014	26/07/2014	7 à 9 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2013	16/08/2013	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/07/2012	05/08/2012	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2011	29/07/2011	15 à 17 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2010	18/08/2010	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran	22/07/2009	06/08/2009	11 à 13 jours avant NECTAROSS cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/07/2008	04/08/2008	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2007	31/07/2007	3 à 5 jours avant NECTAROSS cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/07/2006	08/08/2006	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/08/2018	19/08/2018	8 à 10 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2017	03/08/2017	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/07/2016	09/08/2016	13 à 15 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/08/2015	12/08/2015	6 à 8 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2014	05/08/2014	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/08/2013	19/08/2013	15 à 17 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2012	10/08/2012	14 à 16 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2011	10/08/2011	Epoque NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/07/2010	12/08/2010	10 à 12 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/07/2009	16/08/2009	13 à 15 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/07/2008	11/08/2008	5 à 7 jours avant NECTAROSS cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2007	13/08/2007	4 à 6 jours avant NECTAROSS cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/08/2006	21/08/2006	11 à 13 jours avant NECTAROSS cov

**RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN**

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP/CEP/INRA/CTIFL et stations régionales.*

