

COULOURED® Couloubelle COV

EPOQUE DE MATURITE :

GLADYS® Zailati cov, du 14/08/2019 au 25/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

GLADYS® Zailati cov, du 02/09/2019 au 12/09/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENITEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France


COV : En demande

Certification : En cours

N° Etude : EP 98.10

L'arbre

- Vigueur : Moyenne
- Port : Acrotone, demi-érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-tardive
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde, légèrement aplati et régulier, parfois mucroné.

La coloration est rouge foncé à rouge rosé (90 à 50% de la surface), marbrée et lumineuse. La couleur de fond est vert crème à crème.

L'épiderme est épais, légèrement ponctué.

Le noyau est de taille moyenne, très libre.

La fermeté est bonne et peut évoluer rapidement certaines années.

La chair est juteuse et la qualité gustative est bonne.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 12	
Acidité (meq/100ml)		11 14	
Arômes			

(*) IR pimprenelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être taillée trop précocement, avant que l'on discerne sa floribondité
- être oubliée lors de la taille d'été

Elle apprécie :

- par dessus tout la lumière et l'aération
- que les rameaux mixtes soient insérés sur coursonnes
- bénéficier d'une taille semi-allongée

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur et de l'époque de maturité, une distance moyenne de 3 à 3.5 m sur le rang en situation poussante est un bon compromis. Une association avec un porte-greffe vigorisant peut être utile.

Taille de formation

Les écimages d'été sont indispensables si l'on veut obtenir un arbre ouvert, car il est naturellement très érigé. Dans la plupart des situations, ils devront s'accompagner d'attachages destinés à parfaire l'ouverture (mode taillé-tiré). Du fait du port de l'arbre, les sous-mères sortent difficilement ; il faut donc attacher une attention particulière à leur présence et les attacher entre elles pour les maintenir. L'existence de ces sous-mères est importante, car elles vont permettre une entrée en production plus rapide et contribueront au maintien du potentiel de production.

Taille de fructification

Elle est à réaliser sur rameaux mixtes et tous types de bois non affaiblis.

Les rameaux mixtes sont de qualité moyenne à bonne. Les plus courts évoluent mal et s'annulent.

Il est impératif d'attacher le plus possible de bois de deux ans afin de renouveler les coursonnes.

Le repècement est difficile, ce sont généralement des productions courtes qui sont positionnées sur le bois de deux ans. Il faut arriver à concilier une taille assez longue et une nécessité d'éclaircissement : la taille en vert est donc particulièrement importante. Globalement, l'arbre a tendance à vieillir prématurément.

Eclaircissage

Il est généralement de faible intensité, il peut être réalisé assez tardivement, compte tenu de l'époque de maturité. Les années de très forte nouaison, une retaille complémentaire des rameaux faibles et pendants sera nécessaire afin d'éliminer les fruits de qualité secondaire.

Alimentation hydrominérale

Elle doit être adaptée au potentiel de production de la variété, mais ne doit pas être excessive. Une sur-fertilisation azotée ne doit pas être calculée au regard de la vigueur des arbres. Elle ne leur profiterait pas, mais contribuerait à augmenter la sensibilité aux maladies de conservation.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 40-45 tonnes par ha produites pour un poids moyen de fruit de 160-170 g (AA et plus 50 %, A 40 %, B 10 %). Le nombre de fruits objectif sera donc d'environ 240 000 à 250 000 par ha.

Cette variété est plus colorée, mais présente un potentiel de production plus limité que d'autres variétés de même époque.

Sensibilités particulières

COULOURED® Couloubelle cov est peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Cette variété est sensible aux climats irréguliers à l'approche de la récolte, les températures basses ayant tendance à provoquer des chutes de fruits assez importantes par détachement de leur pédoncule.

Appréciation

COULOURED® Couloubelle cov est une variété tardive dont la présentation du fruit est attrayante à cette époque de maturité. La coloration de l'épiderme est très influencée par les conditions climatiques du moment.

Dans certaines situations, elle peut être sensible à la chute des fruits.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2017	28/08/2017	13 à 15 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2016	28/08/2016	20 à 22 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2015	29/08/2015	13 à 15 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2014	17/08/2014	19 à 21 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2013	03/09/2013	12 à 14 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	16/08/2012	26/08/2012	15 à 17 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/08/2011	19/08/2011	18 à 20 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/08/2010	07/09/2010	14 à 16 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2009	30/08/2009	12 à 14 jours avant GLADYS® Zailati cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Roussillon (66)			
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2008	30/08/2008	10 à 12 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2007	04/09/2007	8 à 10 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/08/2019	25/08/2019	GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/08/2017	26/08/2017	8 à 10 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/08/2016	27/08/2016	20 à 22 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/08/2015	05/09/2015	12 à 14 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2014	20/08/2014	21 à 23 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/08/2013	05/09/2013	18 à 20 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2012	31/08/2012	18 à 20 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/08/2011	21/08/2011	19 à 21 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2010	11/09/2010	19 à 21 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2009	01/09/2009	19 à 21 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2008	04/09/2008	18 à 20 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/08/2007	02/09/2007	14 à 16 jours avant GLADYS® Zailati cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2006	04/09/2006	10 à 12 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/09/2019	12/09/2019	GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2017	01/09/2017	GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/08/2016	03/09/2016	21 à 23 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	31/08/2015	09/09/2015	GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/08/2014	28/08/2014	19 à 21 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/09/2013	14/09/2013	14 à 16 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/08/2012	09/09/2012	12 à 14 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/08/2011	27/08/2011	9 à 11 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/09/2010	10/09/2010	7 à 9 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	28/08/2009	10/09/2009	9 à 11 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/08/2008	08/09/2008	10 à 12 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2007	03/09/2007	6 à 8 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/09/2006	11/09/2006	5 à 7 jours avant GLADYS® Zailati cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

