

VERYGOOD® Maillargood COV

EPOQUE DE MATURITE :

4 à 6 jours après O'HENRY® Mercil cov, du 15/08/2011 au 31/08/2011, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

OBTENITEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France

COV : En cours

Clone INFEL® : 7369

Certification : Oui

N° Etude : EP 94.20

L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Intermédiaire, demi-étalé
- Débourrement : D'époque précoce
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau mixte, parfois plus faible
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme très ronde, régulier, avec une cuvette sur le sommet. La coloration rouge foncé à rouge orangé (70 à 90 % de la surface), sur fond jaune orangé est lumineuse.

L'épiderme est très épais.

La fermeté est bonne. Le fruit mûrit par sa base.

La chair est fine et très juteuse (noyau semi-adhérent). Elle le reste même après passage au froid.

La qualité gustative est bonne à très bonne.

Elle se caractérise par une bonne tenue des fruits sur l'arbre et une récolte relativement groupée.



	Faible	Moyen		Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12	
Acidité (meq/100ml)		9	11	
Arômes				

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être oubliée par la taille en vert
- bénéficier d'une taille trop stricte
- une sous-charge qui entraîne un sur-calibrage des fruits

Elle apprécie :

- une taille intermédiaire associant des rameaux mixtes et du bois de 2 ans
- des conditions climatiques favorables au moment de la maturité des fruits

VERYGOOD® est une variété facile à conduire mais un peu lente à atteindre son potentiel de production qui n'en sera pas moins très élevé par la suite.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur de VERYGOOD® et de son époque de maturité, l'utilisation d'un porte-greffe vigoureux est indispensable.

La distance entre arbres pourra alors être portée à 3.5 m pour une conduite en gobelet ouvert ou double Y.

Taille de formation

L'arbre est facile à former.

Les écimages d'été réalisés en première et deuxième année permettront d'obtenir une bonne ouverture des charpentières.

Néanmoins, les fortes charges autorisées à cette époque ont une incidence sur l'affaissement des charpentières.

Il est fort probable qu'un soutien des charpentières soit nécessaire lors de la pleine production.

Il est préférable de ne pas écimager les sous-mères et de les laisser se développer avant de les attacher plutôt que de les former par taille, ce qui aurait pour effet de les affaiblir rapidement.

Taille de fructification

Les rameaux installés directement sur les grosses structures sont peu floribonds et peu fertiles.

Il faudra réaliser une taille sur rameaux mixtes insérés sur coursonnes et bois de 2 ans non affaiblis.

Même si le reperçement sur les rameaux a tendance à se faire en extrémité, les productions obtenues sont de qualité.

Eclaircissage

Il est d'intensité faible à moyenne et réalisé en une seule fois, tardivement.

Si cela est possible, il sera qualitatif, en éliminant les fruits dans les parties basses et ombrées de l'arbre.

De même, une retaille avant éclaircissage peut permettre de supprimer les fruits portés sur des rameaux pendants et sans accroissement.

Potentiel de production

Il est très élevé grâce au très fort potentiel de calibre du fruit et à sa capacité à grossir sur tous types de bois.

En situation favorable, il peut atteindre 40 tonnes par ha voire plus pour un poids moyen de fruit de 180 g (AA et plus 60 %, A 30 %, B 10 %).

Le nombre de fruits objectif sera proche de 250 000 par ha dans de bonnes conditions de culture.

La récolte est relativement groupée.

Une charge excessive sur jeunes arbres a tendance à les affaiblir prématurément.



Sensibilités particulières

VERYGOOD® est très peu ou pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit de froid hivernal.

La variété est sensible à l'oïdium.

Le fruit est sensible aux maladies de conservation.

A la récolte, le fruit se détache sans pédoncule.

Appréciation

VERYGOOD® est une variété tardive qui a une très bonne tenue au verger et en post récolte. La présentation du fruit et sa qualité gustative sont exceptionnelles pour l'époque. L'adaptation de cette variété est meilleure dans les zones méridionales de production.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2011	31/08/2011	4 à 6 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/09/2010	14/09/2010	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2009	02/09/2009	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2008	02/09/2008	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2007	02/09/2007	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/09/2010	13/09/2010	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/08/2009	08/09/2009	6 à 8 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/08/2008	14/09/2008	7 à 9 jours après O'HENRY® Mercil cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/08/2007	03/09/2007	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/09/2006	14/09/2006	9 à 11 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/09/2010	21/09/2010	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/09/2009	15/09/2009	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/09/2008	15/09/2008	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	27/08/2007	09/09/2007	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/09/2006	21/09/2006	5 à 7 jours après O'HENRY® Mercil cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

