

NABYR cov

EPOQUE DE MATURITE :

3 à 5 jours avant ZEPHYR® Monphir cov, du 06/08/2019 au 16/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

3 à 5 jours après ZEPHYR® Monphir cov, du 08/08/2019 au 20/08/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

ZEPHYR® Monphir cov, du 20/08/2019 au 02/09/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENTEUR(S) : AC FRUITS, Bouches du Rhône, France


EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : En cours

N° Editeur : SF 12.326

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé à érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque très tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque tardive
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre linéaire
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est attrayant à très attrayant, de forme ronde, légèrement aplati, régulier, avec une cuvette sur le sommet. La cavité pédonculaire est très profonde.

La coloration rouge grenat à rouge rosé est intense (60 à 90 % de la surface) et lumineuse. La couleur de fond est blanc crème.


L'épiderme est épais, légèrement ponctué.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté très bonne et évolue très lentement. La texture est croquante.

La chair est fine, juteuse.

La qualité gustative est bonne à très bonne et caractérisée par une saveur douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 13
Acidité (meq/100ml)	5 8		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- une trop forte charge les premières années qui « fatigue » les arbres et effondre les charpentières
- produire sur rameaux faibles

Elle apprécie :

- une taille en vert avant récolte
- être taillée après récolte
- un bon coursonnage portant de beaux rameaux mixtes

La conduite

Distances de plantation

Dans de bonnes conditions de culture, des distances classiques de 3 à 3.5 m entre arbres sont adaptées à une conduite en gobelet ou Double Y.

Compte tenu du potentiel de production, il est utile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

Son port érigé rend les écimages indispensables, ils doivent être réalisés en première, deuxième, voire troisième année. Ils permettront également de favoriser la sortie des sous-mères qu'il faudra veiller à maintenir.

Par la suite, la conduite de l'arbre est facile, il faut néanmoins veiller à éviter l'affaissement des charpentières

Taille de fructification

Elle est "classique" pour des variétés à cette époque de maturité : elle doit être réalisée sur rameaux mixtes et tous types de bois non affaiblis.

Le bois de qualité est généralement porté sur les coursonnes et bois de 2 ans. Il faudra, au fur et à mesure du vieillissement des arbres, renouveler les coursonnes en pliant le plus souvent du bois de 2 ans.

La pré-taille réalisée après récolte permet d'enlever les bois de 2 ans verticaux parfois porteurs de fruits momifiés.

Eclaircissage

Il est généralement de faible à moyenne intensité et peut être réalisé en une seule opération. Il doit être réalisé sur petits fruits à une époque intermédiaire ou tardivement, compte tenu de l'époque de maturité.

Taille en vert

La taille en vert est indispensable pour éclairer l'intérieur de l'arbre afin d'éviter le dénudement des parties basses et favoriser la coloration des fruits situés à l'intérieur des arbres.

Récolte

4 à 6 passages, environ tous les 5 jours.

Potentiel de production

Il est très élevé et peut être estimé à 40-50 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 160-180 g (AA et + 80 %, A 20 %).

Le nombre de fruits objectif avoisine donc les 260 à 320 000 à l'ha. Dans d'excellentes conditions de culture, la variété peut atteindre des résultats bien supérieurs à ces valeurs.

Sensibilités particulières

La variété n'est pas sensible aux chutes de bourgeons liées à un automne "chaud" et à un déficit en froid hivernal. Elle est peu sensible aux maladies de conservation. En cas de trop forte vigueur, une perte du pourcentage de coloration de l'épiderme peut être observé.

Appréciation

NABYR cov est une variété dont les fruits ont une belle présentation, à fort potentiel de calibre et à maturité échelonnée.

Elle peut remplacer avantageusement la variété ZEPHYR® Monphir cov grâce à sa coloration plus soutenue mais avec une maturité décalée de quelques jours.

La qualité gustative de cette variété est bonne.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/08/2019	20/08/2019	3 à 5 jours après ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/08/2018	13/08/2018	4 à 6 jours après ZEPHYR® Monphir cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2017	17/08/2018	4 à 6 jours après ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/08/2019	16/08/2019	3 à 5 jours avant ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2018	22/08/2018	3 à 5 jours après ZEPHYR® Monphir cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2017	22/08/2017	4 à 6 jours après ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2019	02/09/2019	ZEPHYR® Monphir cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2018	25/08/2018	4 à 6 jours après ZEPHYR® Monphir cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.